

Agrovet

Ectonil® Pour On

Garrapaticida e Insecticida de Múltiple Acción y Efecto Extendido para Uso Epicutáneo en Bovinos.

Acción contra moscas de los cuernos y garrapatas resistentes a otros ecto-parasitícos.

USO VETERINARIO

ALTO, LEA LO SIGUIENTE ANTES DE USAR EL PRODUCTO

FORMULACIÓN: Fipronil 1 g, excipientes c.s.p. 100 mL.

ECTONIL® Pour On es un insecticida cuyo ingrediente activo es el fipronil (1% p/v), un derivado de los fenilpirazoles. Por ser un nuevo compuesto no relacionado con los ya existentes controla parásitos externos resistentes a otras moléculas como piretroides, organofosforados y amidinas. Por su formulación (de bajo volumen y lista para su uso) al ser aplicado en el dorso de los animales se distribuye perfectamente por toda la piel y el pelo de los animales por tener afinidad hacia las glándulas sebáceas y sus secreciones.

BENEFICIOS: Alta eficacia contra cepas resistentes a piretroides y fosforados de la mosca de los cuernos y garrapatas. Facilidad de aplicación. Más control por más tiempo. Menos estrés por menos movimientos y baños. Más ganancia de peso. Seguridad para el animal y para la persona que lo aplica.

INDICACIONES: Está indicado para el tratamiento y control de los siguientes parásitos externos de los bovinos: garrapatas (*Rhipicephalus microplus*), mosca de los cuernos (*Haematobia irritans*), piojos masticadores (*Damalinia bovis*), piojos chupadores (*Lingognathus vituli*) y misias nodular (*Dermatobia hominis*); y otros parásitos externos que afectan a ovinos, camélidos, equinos, cuyes y aves.

DOSIFICACIÓN Y MÉTODO DE APLICACIÓN: Aplicación epicutánea. La dosis recomendada es de 1 mL por cada 10 kg de peso vivo, correspondiente a 1 mg de fipronil por kg de p.v., en cuyes y aves la dosis es equivalente a 0.1 mL por kg de p.v. (2 gotas/kg). Retirar la tapa, presionar levemente hasta que el exclusivo sistema Pourmatic® del frasco permita llenar la dosis requerida en la cámara superior. Aplicar topicalmente a lo largo de la línea dorsal que se extiende desde la cruz hasta la base de la cola. Para resultados óptimos ECTONIL® Pour On debe aplicarse a todos los animales del hatillo dentro de un programa planificado de control de parásitos externos. El intervalo de tratamiento puede ser de al menos 2 meses pero dependerá de la severidad de la infestación, condiciones ambientales y condiciones del centro de cría. Consulte a su Veterinario para determinar el momento más adecuado para el tratamiento.

PERÍODO DE RETIRO: Carne: 100 días. No usar en animales productores de leche para consumo humano. No usar en vaquillonas destinadas a la producción láctea durante los tres meses previos al parto.

RESTRICCIONES DE USO: Sólo para uso externo. NO APLICAR POR OTRA VÍA.

PRECAUCIONES: Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar, lejos de alimentos, productos de higiene y medicamentos. No reutilizar el envase vacío. Evite contaminar cursos de agua como ríos, arroyos, etc. Lavar las manos y piel expuesta luego del uso. De existir contacto directo con la piel, lavar con abundante agua y jabón. De existirlo en los ojos, hacerlo con abundante agua durante 15 minutos. Si se ingiere, beber grandes cantidades de agua, acudiendo de inmediato al médico con esta etiqueta. Si existe intoxicación, llevar de inmediato a emergencia y mostrar esta etiqueta al médico. No existe antídoto específico. Mantener alejado del alcance de los niños y animales domésticos.

MEDIDAS ADICIONALES: No contaminar agua, comida, alimentos con el producto o el envase lleno o vacío. Almacenar en su envase original. Transportar por separado de alimentos y medicamentos. Envuelva el frasco en varias hojas de papel y arrojelo a la basura, nunca al agua pues afecta animales acuáticos. Almacenar entre 15°C y 30°C.

Reg. SENASA Perú: F.07.03.N.0281; BOLIVIA SENASAG Reg. PUV- N° 006006/14; Costa Rica: Reg. MAG MV-5861; Reg. Ecuador: 3B1-3-9149-AGROCALIDAD; Reg. Guatemala: PE634-43-02-5227; Reg. Honduras: MV-3528; Reg. Nicaragua: MV-10603; Reg. Panamá: MV-3332; Reg. Rep. Dominicana: 5624; Reg. Sta. Lucia: 2015/008.

Importado y distribuido en Ecuador por Grupo Grandes S.A. Calle N74C y Calle E4, Quito.

Fabricado en Perú para y bajo licencia de Agrovet Market S.A.

VENTA BAJO RECETA

Av. Canadá 3792-3798, San Luis. Lima 15021 - Perú
(511) 2 300 300
ventas@agrovetmarket.com
www.agrovetmarket.com

Agrovet
MARKET

Agrovet

Ectonil® Pour On

Tick killer and Insecticide of Multiple Action and Extended Effect for Epicutaneous Use in Cattle.

Action against horn flies and ticks resistant to other ecto-parasiticides.

VETERINARY USE

STOP, READ BELOW BEFORE USING THE PRODUCT

FORMULATION: Fipronil 1 g, excipients q.s.ad. 100 mL.

ECTONIL® Pour On is an insecticide which active ingredient is fipronil (1% w/v), a derivative from phenylpyrazole, that controls external parasites resistant to pyrethroids, organophosphates and amidines. Due to its formulation (low volume and ready to use) when is applied on animal's dorsal line, it gets a distribution all over the skin and hair of animals because it has an affinity for sebaceous glands and its secretions.

BENEFITS: High efficacy against ticks and horn fly strains resistant to pyrethroids and organophosphates. Easy application. Major control for longer time. Less stress due to less movements and baths. More weight gain. Safety for animal and person who handles it.

INDICATIONS: Treatment and control of the following external parasites of cattle: Ticks (*Rhipicephalus microplus*), horn fly (*Haematobia irritans*), chewing lice (*Damalinia bovis*), sucking lice (*Lingognathus vituli*) and nodular myiasis (*Dermatobia hominis*); and other parasites that affect sheep, camelids, horses, guinea pigs and poultry.

DOSAGE AND APPLICATION METHOD: Epicutaneous application. The recommended dose is 1 mL/10 kg of body weight, equivalent to 1 mg of fipronil/kg b.w. Guinea pigs and poultry: The recommended dose is of 0.1 mL/kg b.w., equivalent to 1 mg of fipronil/kg b.w. (2 drops/kg). Remove the cap, press slightly until the exclusive bottle system Pourmatic allows to fill the required dosage in the superior camera. Apply along the dorsal line in a narrow strip extending along the top of the back from the withers to the tailhead. For optimal results, Ectonil Pour On must be applied to all the animals in the herd on an external parasitic control program. The treatment interval could be at least every two months, it will depend on the severity of the infestation, weather and management conditions in the herd. Consult your veterinarian to determine the better moment for the treatment.

WITHDRAWAL PERIOD: Meat: 100 days. Do not use in lactating cattle producing milk for human consumption. Do not use in pregnant cows or heifers, which are intended to produce milk for human consumption, within 3 months of expected parturition.

USE RESTRICTIONS: External use only. DO NOT APPLY BY ANOTHER ROUTE OF ADMINISTRATION.

PRECAUTIONS: Do not reuse the empty container. Avoid contaminating leaks such as rivers, streams, etc. Wash the exposed hands and skin after its use. If there is a direct contact with the skin, wash with plenty of water and soap. If there is a contact with the eyes, do it with plenty of water for 15 minutes. If ingested, drink large amounts of water, going immediately to the doctor with this leaflet. If there is a case of intoxication, take the person immediately to emergency and show this leaflet to the doctor. There is not a specific antidote. Keep out of reach of children and pets.

ADDITIONAL MEASURES: Do not contaminate water or food with the product or the empty or filled container. Store in its original container. Wrap the container in several sheets of paper and throw it to the garbage, never to the water because it affects aquatic animals. Keep in a dry, cool place, protected from the sun light between 15° to 30°C.

Reg. SENASA Perú: F.07.03.N.0281; BOLIVIA SENASAG Reg. PUV- N° 006006/14; Costa Rica: Reg. MAG MV-5861; Reg. Ecuador: 3B1-3-9149-AGROCALIDAD; Reg. Guatemala: PE634-43-02-5227; Reg. Honduras: MV-3528; Reg. Nicaragua: MV-10603; Reg. Panamá: MV-3332; Reg. Rep. Dominicana: 5634; Reg. Sta. Lucia: 2015/008.

Manufactured in Peru for and under license of Agrovet Market S.A.

Av. Canada 3792-3798, San Luis. Lima 15021 - Peru
(511) 2 300 300
ventas@agrovetmarket.com
www.agrovetmarket.com

Agrovet
MARKET