

TYLVAX® C PX**1. GENERALIDADES**

1.1. **Nombre comercial:** TYLVAX® C PX

1.2. **Clase de uso:** Antibiótico - Asociación Sinérgica Tetraciclina + Macrólido de Última Generación y Amplio espectro.

1.3. **Formulación:** Polvo - Premezcla

2. COMPOSICIÓN

Cada 100 g de TYLVAX® C PX contiene:

Componente	Cantidad	Unidad
Tilvalosina (acetilisovaleriltilosin)	2	g
Clortetraciclina (Como clorhidrato)	20	g
Excipientes c.s.p.	100	g

3. DESCRIPCIÓN

Tylvax® C Px es una asociación antibiótica de flujo libre para la medicación del alimento. Provee 20 mg/g de actividad de tilvalosina y 200 mg/g de clortetraciclina. y es muy eficaz frente a enfermedades importantes en cerdos y aves de corral. Posee acción contra microorganismos Gram positivos y Gram negativos y una excepcional actividad antimicoplásmica. La eficacia de la tilvalosina es hasta diez veces mayor que la tilosina y la asociación con una tetraciclina aumenta el efecto antibiótico, potenciando su acción y ampliando su espectro a infecciones mixtas.

4. INDICACIONES

TYLVAX® C PX está indicado para el tratamiento y prevención de enfermedades respiratorias, entéricas, mixtas y/o complicadas causadas por microorganismos sensibles a la tilvalosina y/o a la clortetraciclina, principalmente:

Cerdos: Micoplasmosis, neumonía micoplásmica (enzoótica) causada por *M. hyopneumoniae*, Enteropatía proliferativa Porcina (EPP), ileítis porcina causada por *Lawsonia intracellularis*, Disentería porcina, causada por *Brachyspira hyodysenteriae*, colitis, causada por *Brachyspira pilosicoli*, rinitis atrófica, neumonías, pleuroneumonía porcina, enfermedad de Glässer, sinovitis infecciosa, enteritis necrótica e infecciosa de diversas patologías (salmonelosis, colibacilosis), Linfadenitis estreptocócica (abscesos cervicales) y abscesos de las articulaciones (*Staphylococcus spp*, *Corynebacterium spp*, *Streptococcus spp*). Infecciones bacterianas secundarias a virus o micoplasmosis. En periodos de estrés para mantener la ganancia de peso corporal.

Pollos y Pavos: Enfermedad respiratoria crónica (CRD), saculitis aérea y sinusitis infecciosa causadas por *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae* y *Mycoplasma meleagridis* (pavos). Enteritis necrótica asociada a *Clostridium perfringens*, enteritis bacterianas. ORT (*Ornithobacterium rhinotracheale*). Colisepticemia, coriza infecciosa, cólera aviar, neumonías, onfalitis, sinovitis infecciosa. Infecciones bacterianas secundarias a virus, coccidias (*Eimeria spp*). Infecciones secundarias por *E. coli* asociadas a rinotraqueitis en

pavos. Estrés o mortandad temprana por causas inespecíficas. En periodos de estrés para mantener la ganancia de peso corporal.

5. ESPECIES DE DESTINO

Aves (pollos, pavos y pollas de remplazo) y cerdos.

6. DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

Vía oral mezclado en el alimento a las siguientes concentraciones:

Cerdos:

Preventivo: 100-250 g/100 Kg de alimento por 21 días. Terapéutico: 250-400 g/100 kg alimento por 7-14 días.

Aves:

Preventivo: 100g/100 Kg de alimento por 7 a 14 días. Terapéutico: 250 g/100 kg alimento por 7-10 días. **Tylvax® C Px** deberá mezclarse con al menos el 5% de alimento a dosificar y luego ser incorporado a la totalidad del mismo. Administrar el alimento medicado como única ración durante los periodos recomendados. Consulte a su veterinario antes de iniciar cualquier tratamiento.

7. RECOMENDACIONES Y CONTRAINDICACIONES

- No existen interacciones ni reacciones adversas conocidas.
- Evitar en animales con historial de hipersensibilidad.
- Cuando se mezcle el medicamento veterinario y manipule el alimento medicado, se debe evitar el contacto directo con ojos, piel y mucosas.
- Lavar manos y la piel expuesta después del uso. En caso de contacto con los ojos, inmediatamente enjuagar con abundante agua.
- En caso de ingestión accidental o si aparecen síntomas, consulte inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Las personas con una conocida hipersensibilidad a los componentes deben evitar cualquier contacto con el producto.
- No ha quedado demostrada la seguridad durante la gestación y la lactancia en cerdas, usar de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo del veterinario responsable.
- No utilizar en cuyes, chinchillas ni hamsters pues su uso puede devenir en enterocolitis severa e incluso la muerte del animal.

8. PERIODO DE RETIRO

Carne: 5 días. No debe usarse en gallinas ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano.

9. ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C, en un lugar seco y bien ventilado, mantener fuera del alcance de los niños. Se recomienda utilizar todo el contenido una vez

abierto. No almacenar bolsas abiertas. El alimento con el producto incorporado debería ser utilizado antes de los 30 días.

10. PRESENTACIONES

Bolsas x 10g, 15g, 20g, 50g, 100g, 250g, 500g, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg y 25kg.